

Vaccin du patient drépanocytaire Adaptation du calendrier recommandé Dr. Isabelle HAU, CHIC

AVANT 2 ANS

Pn 13

2 mois

Hexa Nimenrix 3 ou 5 mois

Pn 13 3 mois Hexa 4 mois

Pn 13 4 mois Hexa 11 mois

Pn 13 11 mois ROR 1 12 mois

> Nimenrix, ou Menveo 12-18 mois

12-18 mois

Grippe annuelle:
de 6 mois à 18 ans
2 doses la première année de vaccin (avt 9 ans)
1 dose les années suivantes

ROR 2 → 16 – 18 mois Pneumo 23 24 mois

Bexsero
3mois
Si possiblepas de coadm

Bexsero 5 mois

Bexsero 13 mois

Après 2 ANS

pneumo23 2 ans Bexsero
Si non fait
avant 1an

Bexsero:

2eme dose
Au moins 2 mois après

DTPCa

6 ans

dTPca 11-13 ans

HPV si fille HPV 2eme 11-13 ans 6mois après

Nimenrix Ou Menveo

DTPCa= tetravac ou infanrix tetra dTPCa repevax ou boostrix tetra

HPV=gardasil 9(si 1ere dose faite après 13 ans alors 3 doses M0-m2-m6)