



La Bronchiolite à VRS des moyens de prévention existent!

Le VRS est un virus très contagieux qui provoque des infections respiratoires comme la bronchiolite.

Avant l'âge de 2 ans, 9 bébés sur 10 auront été infectés par le VRS. En France, le VRS circule généralement l'hiver, avec des épidémies de septembre à mars.

Un bébé sur 20 est hospitalisé pour bronchiolite durant sa première année de vie. La grande majorité des bébés hospitalisés n'ont pas de facteurs de risque et sont nés à terme et en bonne santé.



Un nouvel anticorps spécifique, le nirsevimab, permet de réduire de façon très importante (plus de 80%) les hospitalisations dues au VRS chez les nourrissons de moins de 6 mois ayant reçu 1 seule dose.

Ce n'est pas un vaccin mais une immunisation et les effets secondaires sont rares et minimes (rougeurs au point injection, rarement une petite éruption passagère).



Parlez-en avec le médecin généraliste de votre enfant ou avec son pédiatre.

Lancement de la campagne de prévention



1 injection à administrer le plus tôt possible après la naissance, quel que soit le terme de la naissance pour protéger votre enfant.

Au CHIC

1 injection sera proposée pour votre enfant :

- lors de son hospitalisation
- à la maternité du CHIC pour les enfants nés entre le 15 septembre 2023 et le 15 février 2024
- en consultation programmée au CHIC, pour les nouveau-nés n'ayant pas pu bénéficier de l'injection en maternité ou en hospitalisation
- L'anticorps peut être prescrit lors d'un passage aux urgences pour être fait soit en ville, soit au CHIC en consultation programmée

En ville

Si vous ne souhaitez pas que l'injection ait lieu au CHIC, **une ordonnance** vous sera remise.

Cette ordonnance vous permettra :

- un retrait gratuit en pharmacie, muni d'une carte vitale
- une injection en ville par un médecin ou un(e) infirmier(e) de votre choix

Prévention de la bronchiolite :

découvrez "8 actions pour protéger mon bébé de la bronchiolite"

- 1 Lavez-vous les mains régulièrement
- 2 Aérez la chambre et les pièces de vie
- 3 Évitez toute exposition au tabac
- Évitez les endroits confinés et fréquentés (supermarchés, transports en commun...)

- Évitez les contacts avec les personnes enrhumées
- 6 Portez un masque si vous êtes malade
- Évitez le partage de tétines, biberons et jouets avec d'autres enfants, et lavez-les régulièrement
- 8 Renseignez-vous sur la nouvelle modalité de prévention contre le virus "VRS"