

# COQUELUCHE

## DES MOYENS DE PRÉVENTION EXISTENT !

### La coqueluche, c'est quoi ?

La coqueluche est une **infection respiratoire causée par une bactérie**. Très contagieuse, elle se transmet par la toux des personnes infectées. Les formes graves touchent surtout les nourrissons de moins de 3 mois ainsi que les personnes fragiles.

**L'épidémie de coqueluche s'est intensifiée en France**, avec 28 décès rapportés depuis le début de l'année 2024.



### Comment protéger votre bébé ?

**La vaccination des femmes enceintes est recommandée entre le 5<sup>e</sup> et le 8<sup>e</sup> mois de grossesse** (entre 20 et 36 semaines d'aménorrhée) pour protéger le nouveau-né et le nourrisson jusqu'à ses 6 mois.

La femme vaccinée produit en effet des anticorps qui sont transférés à son bébé avant sa naissance et qui le protégeront. Sa vaccination permettra :

- de réduire par 4 le risque de contracter la coqueluche,
- de diminuer de moitié le nombre d'hospitalisations,
- de réduire de 95 % le nombre de décès liés à la coqueluche.

*Pour en savoir plus, consultez votre médecin ou votre sage-femme..*



### La vaccination des nourrissons

1<sup>ère</sup> dose

**8 SEMAINES**

que la mère ait été  
vaccinée ou non

2<sup>ème</sup> dose

**4 MOIS**

Rappel

**11 MOIS**



*Pour en savoir plus, consultez le médecin généraliste ou pédiatre de votre enfant.*

## Au CHIC

**Si vous n'avez pas été vaccinée au cours de votre grossesse, une vaccination vous sera proposée lors de votre séjour à la maternité du CHIC.**

Une ordonnance pourra également être remise au co-parent qui pourra être vacciné en ville (*retrait en pharmacie muni d'une carte vitale - remboursement de 65% par la Sécurité Sociale - un complément est à prévoir par la mutuelle*).



### À NOTER

*En plus des parents, la vaccination est recommandée aux personnes susceptibles d'être en contact étroit avec le nourrisson (fratrie, grands-parents et autres personnes) durant les six premiers mois de sa vie.*

## Et les gestes barrières ?

La transmission de la coqueluche se fait **par voie aérienne**, au **contact direct d'une personne malade** (*généralement par les adultes ou adolescents vers les nourrissons*).

En cas de symptôme, il est important de respecter les gestes barrières tels que **le port du masque**, **le lavage des mains**, **le nettoyage des surfaces de contact**, ou encore **l'aération** régulière des pièces.

